

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 4 francs)

72,896

—

MÉLANGES
EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

VINGT-SIXIÈME FASCICULE

(12 décembre 1917)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

—

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE

ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

—
1917

Tous droits réservés

LIBRARY
MUSEUM OF ZOOLOGY
CAMBRIDGE MASS.

INTRODUCTION

Je décris plus loin quelques espèces ou variétés nommées, mais que je crois inédites, par Portevin (dont je possède la collection) ou par A. Fairmaire : celle nommée par ce dernier a été acquise avec la collection des Hétéromères de Bonneuil. Tous les types font partie de ma collection.

Je n'ai pas à répéter ici quelles sont les raisons qui me font continuer de décrire, et brièvement, la nouvelle série de nouveautés faisant l'objet du présent fascicule. Que les esprits critiques veuillent bien m'en excuser !

Je pense pouvoir faire imprimer sans trop tarder, après l'apparition de celui-ci, un nouveau fascicule, et il est possible qu'ensuite une interruption se produise pour cette publication. Le temps que je puis consacrer à l'entomologie risque d'être de plus en plus parcimonieusement mesuré dans le courant de 1918.

Je n'ai pas trop l'habitude de corriger les coquilles, cependant la description précédente de *Sphingidophorus subænescens* (Mél. 25, p. 18) ayant été un peu trop réduite à l'impression, je crois devoir la compléter ici des mots sautés qui sont : « *fulva ornatis pedibus simplicibus*. Long. 8 mill. Brésil. »

DESCRIPTIONS ABRÉGÉES DIVERSES

Thanatophilus irregularis (Portevin). Oblongus, niger, pro parte griseo-holosericeo pubescens, elytris irregulariter costatis, postice impressis et apice, ad suturam, breve prolongatis. Long. 10 mill. Japon. — Par sa structure élytrale intermédiaire entre *T. auripilosus* Port. et *lapponicus* L.

Diamesus osculans v. nov. reductus. Elytris minute et fere indistincte rufo notatis. Sumatra.

Necrophorus didymus v. nov. peruvianus. Niger, elytris indistincte maculatis. Pérou. — Variété extrême, à élytres foncés, dépourvus de macules orangées distinctes.

Necrophorus insularis v. humeralis (Portevin). Fronte nigro, elytris piceis, antice et postice aurantiaco fasciatis (fascia antica nigro maculata), epipleuris aurantiacis. Java (ex coll. Portevin). — Ressemble à *N. ocellatus* Frm. et distinct, à première vue, par le front non maculé de roux.

Oneilia Bedeli (Portevin). Corpus pubescens, elytra punctato-rugulosa, labro distincte, thorace lateraliter sinuato. Piceo-subænescens, pro parte lateraliter rufo cinctus, antennis pedibusque testaceis ; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis, illo marginato, convexo, postice distincte attenuato ; elytris subovatis, marginatis. Long. 3 mill. Afrique Australe : Dunbrody (ex coll. Portevin). — Placé par l'auteur à côté de son genre *Agyrtes* dont il est très distinct par la forme de son prothorax rétréci vers les angles postérieurs, la sculpture élytrale, la tête à labre très distinct.

Dissochætus dubius (Portevin). Oblongo-ovatus, parum nitidus, luteo pubescens, nigro-piceus, thorace postice et lateraliter, elytris ad basin late pedibusque pro parte rufescentibus ; antennis ad basin tarsisque testaceis. Long. 3 mill. Brésil (ex coll. Portevin). — Voisin de *D. latus* Port., plus allongé, prothorax en partie foncé, etc.

Scaphidium bisbimaculatum n. sp. Satis latus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, antennis apice geniculisque posticis nigris, thorace in disco nigro bimaculato ; elytris ad medium pygidioque piceo maculatis ; elytris in disco lineato punctatis. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin de *S. bipunctatum* Redt., mais élytres bimaculés de noir.

Scaphidium semilimbatum n. sp. Parum latus, nitidus, rufus, oculis, antennis apice et infra corpore pro parte nigris, thorace in disco nigro bimaculato et ad basin nigro marginato ; elytris ad suturam, ad basin lateraliter, antice et apice nigro cinctis, ad medium nigro fasciatis, in disco minute punctatis. Long. 5 mill. Chine. — Espèce à dessins élytraux rappelant ceux de *S. madanense* Ach. mais avec une fascie médiane externe noire, au lieu de macules, prothorax autrement coloré, etc.

Scaphidium madecassum n. sp. Parum latus, nitidus, rufus, antennis apice nigris, elytris ad suturam et antice nigro notatis, distincte lineato punctatis. Long. 4 mill. Madagascar. — Voisin de *pygiale* Pic, élytres à coloration noire moins étendue et plus fortement ponctués.

Chelonarium obscuripenne n. sp. Ovato-elongatus, nitidus, mediocre pubescens, rufescens, elytris pro majore parte piceis, tarsis testaceis ; thorace subarcuato-sinuato, irregulariter punctato ; elytris satis elongatis, ad basin impressis, postice mediocre attenuatis, antice minute et sparse albo maculatis, postice transverse lineato albo maculatis. Long. 6 mill. Formose. — Peut se placer près de *C. indicum* Grouv., distinct, à première vue, par la coloration bicolore du dessus du corps.

Hyporrhagus subopacus n. sp. Elongatus, subopacus, parum pubescens, rufescens, thorace in disco brunnescente ; prothorace transverso, mediocre sat sparse punctato, angulis anticis rotundatis, haud productis ; scutello triangulare ; elytris elongatis, apice attenuatis, minute striatis et lineato punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Sans doute voisin de *H. Mathani* R. Ob. en diffère au moins par la coloration différente.

Monomma fulvum n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, fulvus ; thorace breve, fortiter sat dense punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, distincte marginatis, striatopunctatis, punctis pro parte latis. Long. 4 mill. Indes : Malabar. — A placer près de *M. laosense* Pic, coloration différente et ponctuation plus distincte.

Ennearthron sinense n. sp. Robustus, convexus, parum nitidus, breve hirsutus, piceus, antennis pedibusque testaceis ; capite in mare antice breve bicornuto ; supra fortiter et pro parte rugoso punctatus. Long. 3 mill. Yunnan. — Près de *E. tabelliferum* Mell. mais avant-corps différent, forme du corps non subparallèle, etc.

? **Ennearthron multidentatum** n. sp. Robustus, convexus, parum nitidus, minute hirsutus, piceus, elytris pedibusque pro parte rufescentibus ; capite 4-dentato ; thorace dense punctato, antice bicornuto ; elytris fortiter sat dense punctatis. Long. 3 mill. Yunnan. — Diffère du précédent par la structure de sa tête et le prothorax orné de 2 cornes robustes.

Macrocis grandicornis n. sp. Robustus, convexus, sat longe hirsutus, nigro-piceus, abdomine, pedibus et antennis rufescentibus ; capite excavato et longe bicornuto ♂, deplanato et antice marginato ♀ (cornis latis, apice subarcuatis) ; thorace breve, fortiter punctato ; elytris brevibus, irregulariter punctatis. Long. 3 mill. Guyane Française. — Plus robuste que *M. testaceimembris* Pic, avec les cornes plus fortes.

Macrosilis brevior n. sp. Parum latus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pro majore parte, oculis, elytris tarsisque nigris, geniculis brunnescentibus ; thorace antice valde attenuato, lateraliter distincte inciso ; elytris antice brevibus, ruguloso punctatis, lateraliter sinuatis et marginatis. Long. 8 mill. Formose. — Très voisin de *M. Fortunei* Pic, élytres plus courts, prothorax assez fortement incisé vers le milieu d s côtés.

Cantharis explanaticollis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, cyaneo-metallicus, elytris viridescentibus, thorace lateraliter late abdomineque rufo-testaceis ; thorace breve et lato, lateraliter explanato et late impresso. Long. 20 mill. Formose. — Voisin de *C. (Themus) cyanipennis* Mots., prothorax plus large et de sculpture différente, abdomen roux.

Cantharis testaceohumeralis n. sp. Elongatus, nitidus, subsericeo pubescens, testaceus, antennis, capite et pedibus pro parte nigris ; elytris nigris, ad humeros breve testaceo notatis (forma typica), aut concoloribus (v. nov. *subsericea*) ; thorace parum breve, antice subarcuato et marginato, postice impresso ; elytris elongatis, subparallelis. Long. 8-10 mill. Malacca. — A placer près de *C. longipennis* Frm. distinct, à première vue, par la tête foncée.

Xamerpus perforatus n. sp. Minutus, convexus, nitidus, longe griseo hirsutus, fortiter et parum dense punctatus, rufo-brunneus, pro parte dilutior, antennis pedibusque testaceis. Long. 2 mill. Ceylan. — Très distinct de *X. Maindroni* Pic, par la ponctuation plus profonde et moins dense du prothorax ainsi que par les élytres immaculés.

Dasytiscus atrotibialis n. sp. Elongatus, metallicus, æneo-viridescens, griseo pubescens et nigro hirsutus ; antennis pro parte et femoribus testaceis (forma typica), aut femoribus posticis metallicis (v. nov. *diversipes*). Long. 3,5 mill. Chine : Yunnan. — A placer près de *D. sparshirsutus* Pic.

Attalus rufoapicalis n. sp. Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, pro parte hirsutus, nigro-subæneus ; elytris apice rufo notatis (forma typica), aut concoloribus (v. nov. *inapicalis*) Long. 3 mill. Formose. — Par sa forme se rapproche de *A. niponensis* Pic, mais tout autre par sa coloration.

Hedybius s. g. Hedybioattalus. Tarsis anticis 5 articulatis, articulo 2° ♂ sat longe producto ; capite mediocre excavato et diverse cornuto ; thorace postice instrangulato, subarcuato. — Diffère de *Hedybius* Er. par le prothorax non nettement rétréci en arrière, la tête moins robuste, etc.

Hedybioattalus testaceicornis n. sp. ♂. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens et fusco hirsutus, niger, elytris cæruleis, antennis pedibusque pro majore parte testaceis, capite pallido, in disco et postice nigro, illo minute excavato et antice cornuto ; antennis elongatis, dentatis ; thorace fere impunctato, postice lateraliter albo marginato. Long. 4 mill. Chine. — Voisin de *H. sinensis* Pic (décrit comme *Attalus* Er.), de forme plus allongée avec les membres plus clairs et la tête de structure différente.

Malachius lineaticollis n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo-pubescens et nigro hirsutus, viridescens, capite antice, antennis infra, thorace (illo in disco lineato virescente) elytrisque apice luteis. Antennis ♂ subpectinatis, ♀ simplicibus ; elytris ♂ apice incisis et nigro spinosis. Long. 5,5-6 mill. Formose. — Voisin de *M. flabellicornis* Sols., antennes plus robustes à la base, prothorax orné d'une bande métallique éloignée du bord antérieur.

Pseudoechthistatus n. gen. Thorace elongato, in disco intuberculato, lateraliter longe dentato ; elytris ad basin tuberculatis, apice subacuminatis, inarmatis. — Caractères généraux de *Echthistatus* Pascoe, dont il a entre autres

particularités communes un fort tubercule lisse sur la base de chaque élytre, mais distinct, à première vue, par ces organes non épineux au sommet, ainsi que par le prothorax dépourvu de nodosités discales.

Pseudoechthistatus obliquefasciatus n. sp. Oblongo-elongatus, niger, pro parte et irregulariter luteo maculatus, elytris ad medium oblique albido fasciatis et ante apicem albido maculatis. Long. 18 mill. Chine : Tali.

Ocheutes fasciculatus n. sp. Elongatus, niger, pro parte glaber, pro parte griseo aut fulvo pubescens, elytris postice et lateraliter albo notatis ; thorace in disco multiplicato et lateraliter dentato ; elytris subparallelis, apice truncatis et pilosis, ad basin atrofasciculatis, irregulariter punctatis. Long. 18 mill. Thibet. — Paraît différer de *O. scupuliferus* Thoms. (ex description) par la forme plus allongée, les élytres ornés chacun d'un gros et d'un petit fascicule, à revêtement différent.

Pachyosa diversesparsa n. sp. Satis brevis, niger, pro parte glaber, pro parte griseo aut fulvo pubescens ; antennis corpore longioribus, albo annulatis ; thorace breve, in disco minute tri tuberculato, lateraliter subdentato ; elytris brevibus, apice attenuatis, multi nigro maculatis et griseo undulatis ; pedibus diverse nigro notatis. Long. 12 mill. Chine : Yunnan. — Très distinct de *P. cervinopicta* Frm. (ex description) par l'aspect un peu brillant et les dessins des élytres bien différents, non en forme de fascies.

Hecyrída formosana n. sp. Parum elongatus, satis latus, niger, diverse rufo maculatus, griseo aut fusco pubescens ; vertice sulcato et rufo maculato ; thorace breve, inæquale, lateraliter sinuato et bituberculato ; elytris subparallelis, apice subtruncatis, ad basin minute plicato-elevatis et rufo lineatis, ante apicem rufo sinuatis ; pedibus nigris, rufo notatis. Long. 18 mill. Formose. — Très distinct de *H. asiatica* Pic par les antennes plus longues at-

teignant l'extrémité des élytres et par le revêtement différent.

Pygospermophagus n. g. Coxis anticis contiguïs ; antennis brevibus ; tibiis infra excavatis et longe ciliatis, posticis bispinosis ; pygidio prominulo, e segmentis duabus composito.

Ce nouveau genre, qui se rapproche de *Spermophagus* Schn. par ses éperons mobiles, s'en distingue, à première vue, en outre de ses tibias excavés et ciliés, par le pygidium saillant et très découvert, paraissant composé de deux segments, la partie antérieure étant déprimée et munie, de chaque côté, d'une bande pubescente visible derrière les élytres, tandis que le pygidium proprement dit est un peu surélevé et peu incliné à la base.

Pygospermophagus brevicornis n. sp. Oblongus, niger, sat irregulariter fulvo aut griseo pubescens ; antennis brevibus ; thorace breve, antice attenuato, sat dense et pro parte fortiter punctato ; elytris thorace distincte latioribus, satis elongatis, fortiter striatis, intervallis pro parte fortiter et sparse punctatis ; pygidio valido, rugoso-punctato. Long. 5 mill. environ. Magelies Bergen.

Spermophagus madecassus n. sp. Latus et brevis, parum nitidus, minute et sparse pubescens, niger, pro parte sat dense et minute punctatus, pro parte sparse et fortiter punctatus ; antennis brevibus ; thorace breve, transverso, antice attenuato, ad basin subimpresso ; elytris latis et brevibus, striatis ; pygidio dense punctato ; spinulis rufis. Long. 3 mill. Madagascar : Tananarive. — Peut se placer près de *S. cicatricosus* Gylh., mais stries et ponctuation différentes.

Spermophagus tonkineus n. sp. Subovatus, niger, vage subænescens, fulvo aut griseo pubescens, elytris griseo subfasciatis. Long. 2 mill. Tonkin. — Cette espèce et les 2 suivantes, qui paraissent se rapprocher de *S. niger* Mots., ont de commun les élytres à reflets plus ou moins bronzés.

Spermophagus subænescens n. sp. Subovatus, niger, vage ænescens, fulvo aut griseo pubescens, elytris ad basin et ad medium sparse et parum distincte albonotatis. Long. 2 mill. Java.

Spermophagus æneipennis n. sp. Subovatus, niger, supra distincte ænescens, sparse fulvo-luteo pubescens aut griseo pubescens, elytris irregulariter albido submaculatis. Long. 2 mill. Ceylan.

Spermophagus rufipennis n. sp. Subovatus, sat sparse et regulariter griseo pubescens, niger, antennis ad basin, pedibus anticis et intermediis (tarsis aliquot piceis), femoribus posticis pro parte, abdomine pygidioque plus minusve rufis ; thorace postice parum distincte (forma typica), aut multi (v. *notatithorax*) rufo notatis. Long. 2,5 mill. Cochinchine. — Espèce distincte entre toutes par sa coloration ; à placer près de *S. bimaculatus* Pic et espèces voisines.

Spermophagus ceylonicus n. sp. Subovatus et latus, niger, sparse griseo-albido pubescens et pro parte multi griseo-albido maculatis ; antennis brevibus ; thorace breve, antice paulo attenuato, irregulariter punctato ; elytris punctato-striatis, griseo-albido maculatis ; pygidio ruguloso et dense punctato, parum pubescente ; spinulis rufis. Long. 2,5 mill. Ceylan. — Peut se placer près de *S. tessellatus* Mots., mais élytres mouchetés, au lieu d'être fasciés, de blanchâtre.

Spermophagus formosanus n. sp. Ovatus, niger, vage subænescens, supra sparse griseo notatus, infra dense pubescens, ad medium denudatus ; antennis elongatis ; thorace satis breve, antice attenuato, fortiter sparse punctato ; elytris subovatis, punctato-striatis, ad basin, ad et post medium transverse maculatis ; spinulis rufis. Long. 2 mill. Formose. — Moins large, plus brillant que le précédent avec les macules plus allongées et moins nombreuses.

Spermophagus formosanus v. nov. **subundulatus**. Maculis griseis elytrorum plus minusve junctis. Formose. — Les dessins gris des élytres, plus rapprochés que d'ordinaire, forment des sortes de fascies irrégulières.

Spermophagus negligens n. sp. Subovatus, niger, supra albido et irregulariter fasciatus, infra sat dense albido pubescens ; antennis satis elongatis ; thorace parum breve, antice attenuato ; elytris punctato-striatis, ad medium transverse et irregulariter undulato bifasciatis ; spinulis rufis. Long. 2 mill. Ile Lombok. — Voisin du précédent, moins ovalaire et plus noir, dessins différents.

Spermophagus negligens v. nov. **andamensis**. Oblongo-ovatus, niger, supra albido maculatus. Iles Andaman. — De forme plus allongée que la forme type avec les élytres maculés, et non subfasciés, de noir.

Spermophagus excavatus n. sp. Subovatus et latus, nitidus, niger, parum pubescens, in elytris disperse et vage albo maculatus ; antennis satis elongatis ; thorace breve, transverso, pro parte minute, pro parte fortiter et sparse, punctato, ad basin postice impresso ; elytris latis et brevibus, pro parte minute et pro parte fortiter et sparse punctatis, minute striatis, ad suturam excavatis ; spinulis rufis. Long. 3 mill. environ. Sumatra. — Voisin de *S. Kannegieteri* Pic, mais élytres plus fortement creusés vers la suture et ornés de mouchetures grises.

Spermophagus sparsemaculatus n. sp. Subovatus, sat dense luteo aut albido pubescens, in elytris disperse albo maculatis, niger, femoribus anticis rufo-tinctis ; spinulis rufis. Long. 3,3 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, moins large avec le pygidium plus long, densément ponctué, le revêtement différent, les élytres à peine excavés et seulement en arrière.

Spermophagus multiguttatus n. sp. Oblongo-ovatus, niger, griseo pubescens, thorace elytrisque multi griseo maculatis ; pygidio ad basin luteo ciliato ; spinulis tes-

taceis. Long. 3 mill. Afrique Australe. — Très voisin de *S. albopunctatus* Mots., forme un peu plus large, pygidium différemment, et peu, pubescent, frangé à la base de longs poils jaunâtres.

Spermophagus multipunctatus n. sp. Subovatus, niger, griseo pubescens, pro parte denudatus, pygidio ad basin luteo pubescente ; thorace satis breve, antice attenuato, pro parte disperse-punctato ; elytris striatis ; infra corpore multi nigro punctato ; spinulis testaceis. Long. 2 mill. environ. Sénégal. — Cette petite espèce est très distincte par les mouchetures irrégulières grises des élytres et par une forte ponctuation noire espacée sur la pubescence grise du dessous du corps.

Spermophagus atromaculatus n. sp. Oblongo-ovatus, niger, luteo aut griseo sat regulariter et parum dense pubescens, femoribus anticis et intermediis, abdomine pygidioque rufis, illo nigro maculato ; spinulis testaceis. Long. 3,5 mill. Sumatra. — Espèce très distincte par la coloration de son pygidium rousse avec une macule médiane noire : peut se placer près de *S. albopunctatus* Mots.

Spermophagus testaceiventris n. sp. Oblongo-ovatus, niger, luteo aut griseo pubescens, elytris minute et sparse albo maculatis, scutello albo, abdomine pygidioque testaceis ; spinulis testaceis. Long. 3 à 3,5 mill. Chine : Yunnan. — Voisin de *S. rufiventris* Boh., distinct, à première vue, par les membres entièrement noirs et les élytres brièvement maculés de blanc.

Spermophagus testaticolor n. sp. Elongatus, testaceus, sat dense et regulariter griseo pubescens, oculis nigris ; antennis elongatis ; thorace transverso, dense punctato ; elytris elongatis, postice attenuatis, striatis, intervallis dense punctatis. Long. 3 mill. Japon : Kioto. — Espèce, par sa coloration générale claire, se rapprochant de *S. longissimus* Pic, moins robuste, prothorax plus densément ponctué, pygidium plus saillant, etc.

Glipa balabacana n. sp. Nigro-iridescens, capite thoraceque dense luteo pubescentibus et nigro maculatis ; elytris antice undulato-fasciatis, ad et post medium apiceque transverse griseo fasciatis ; antennis pedibusque nigris. Long. 10 mill. Ile Balabac. — Voisin de *G. malaccana* Pic, mais fascie anteapicale non sinuée, subarquée, avec la précédente droite.

Glipa malaccana v. nov. semirecta. Fascia prima transversa elytrorum recta. Ile Banguey. — Diffère de la forme type par la première fascie pubescente des élytres droite, au lieu d'être sinuée.

Glipa Gounellei n. sp. Elongatus, postice strangulatus, et attenuatus, nigro-iridescens, pro parte griseo pubescens ; elytris ad basin transverse luteo et griseo bifasciatis, longitudinaliter lineatis, ad medium oblique luteo et griseo bifasciatis ; antennis pedibusque nigris. Long. 12 mill. Brésil (Gounelle). — Très voisin de *G. 4-fasciata* Chevr., mais bandes grises à fond jaunâtre avec une ligne pubescente longitudinale supplémentaire reliant les fascies 2 et 3.

Glipa subsinuata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nigro-iridescens, elytris in disco antice luteo notatis, pro parte griseo pubescens ; capite thoraceque undulato pubescentibus, elytris antice oblique aut undulato griseo bifasciatis, ad et post medium sinuato bifasciatis et apice griseo notatis ; antennis pedibusque nigris. Long. 10 mill. Guyane Française. — Distinct du précédent, par les élytres non étranglés, les fascies grises des élytres différentes, la 4^e sinuée et oblique rapprochée du sommet qui, en outre, est pubescent.

Glipa testaceicoxis n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, nigro-iridescens, pro parte griseo pubescens, antennis ad basin, palpis, coxis et femoribus anticis femoribusque intermediis supra testaceis ; elytris (defloratis) parum distincte griseo fasciatis. Long. 10 mill. Java. —

Cette espèce, dont les élytres sont déflorés, ce qui rend leurs dessins indistincts, se distingue facilement de *G. Sauteri* Pic par la coloration des pattes intermédiaires.

Glipa rufonotata n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, nigro-iridescens, elytris in disco late rufescentibus, pro parte griseo pubescens, antennis ad basin pedibusque anticis pro parte rufescentibus ; elytris antice indistincte fasciatis, ad et post medium parum distincte rufo-luteo fasciatis. Long. 8 mill. Sumatra. — Très voisin de *G. formosana* Pic, élytres moins longs, à dessins différents.

Mordella aureofasciata n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, nigro-iridescens, pro parte griseo pubescens ; elytris antice aureo undulato-fasciatis et postice transverse aureo fasciatis. Long. 7-8 mill. Brésil. — Peut se placer près de *M. 4-pustulata* Maek., élytres à dessins dorés et différents, ceux-ci entourant, sur la base, une macule noire.

Mordella multiatronotata n. sp. Satis elongatus, postice minute attenuatus, nigro-iridescens, pro parte luteo pubescens, femoribus anticis pro parte, thorace lateraliter, abdomine pygidioque (his nigro maculatis) rufo-testaceis, elytris rufo-testaceis, aureo pubescentibus, ad basin infra humeros et in disco, ad medium in disco et apice nigro maculatis. Long. 8 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa coloration jointe aux macules noires des côtés de l'abdomen.

Mordella sinensis n. sp. Satis brevis, apice paulo attenuatus, niger, capite antice antennisque ad basin testaceis, elytris ad humeros rufo notatis. Long. 5 mill. Chine: Yunnan. — Peut se placer près de *M. madagascariensis* Pic, moins trapu et dessins des élytres différents.

Mordellistena rufosuturalis n. sp. Elongatus, rufescens, pro parte iridescens, antennis pedibusque 4 anterioribus pallidioribus ; elytris nigris, ad suturam et apice rufo

notatis ; tibiis posticis 5 strigosis. Long. 4 mill. Madagascar. — A placer près de *M. suturella* Frm. et distinct, à première vue, par les élytres sans bordure latérale rousse.

Mordellistena atrolateralis n. sp. Elongatus, griseo aut fusco pubescens, testaceus, capite thoraceque in disco nigro lineatis ; elytris ad suturam et lateraliter nigro cinctis ; pectore, femoribus posticis abdomineque nigro notatis ; tibiis posticis tristrigosis. Long. 3 mill. Tananarive. — Voisin du précédent, très distinct par sa coloration et les rayures moins nombreuses des tibias postérieurs.

Mordellistena atrolateralis v. nov. **subobliterata**. Pro parte niger, pro parte testaceus, capite testaceo, nigro maculato ; thorace nigro, testaceo notato ; elytris nigris, ad humeros breve testaceo notatis. Madagascar.

Mordellistena immaculiceps n. sp. Elongatus, subparallelus, testaceus, infra corpore pedibusque posticis pro parte nigris ; elytris nigris, ad humeros breve testaceo notatis. Long. 2,5 mill. Tananarive. — Diffère, à première vue, du précédent par la tête entièrement testacée.

Mordellistena testaceicolor n. sp. Elongatus, postice distincte attenuatus, testaceus, oculis nigris ; tibiis posticis nigro tristrigosis. Long. 3 mill. Madagascar. — Diffère du précédent, en plus de la coloration générale testacée, par les élytres nettement atténués.

Mordellistena malaccana n. sp. Elongatus, postice attenuatus, testaceus, oculis elytrisque apice minute nigris ; tibiis posticis oblique nigro tristrigosis. Long. 3 mill. Malacca. — Voisin du précédent, rainures des tibias postérieurs plus obliques.

Mordellistena brunneocephala n. sp. Angustatus, subparallelus, testaceus, capite, antennis apice, pedibus et infra corpore pro parte brunnescentibus, thorace in disco vage brunneo maculato ; tibiis posticis pilosis, bistrigosis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin des précédents.

Mordellistena Dohertyi n. sp. Parum elongatus, postice minute attenuatus, griseo pubescens, testaceus, oculis, elytris, corpore infra et pedibus pro parte nigris, tibiis posticis oblique nigro tristrigosis. Long. 4 mill. Malacca (Doherty). — Ressemble à *M. diegosa* Pic, en diffère par sa coloration moins foncée en dessous avec la forme du corps, élytres surtout, moins allongée.

Pseudolagria atra n. sp. Elongatus, nitidus, niger, femoribus ad basin tibiisque pro parte testaceis ; thorace breve, irregulariter, pro parte sat dense, punctato-impreso ; elytris elongatis, parallelis, dense ruguloso-punctatis ; pedibus gracilibus, pilosis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *P. flavomarginata* Chp. et distinct, à première vue, par sa coloration foncée.

Pseudolagria foveithorax n. sp. Oblongus, nitidus, niger, collo, thorace et femoribus ad basin pro parte rufo-testaceis ; antennis satis brevibus ; thorace breve, postice in disco bifoveato, ad basin sinuato et sulcato ; elytris latis, fortiter punctatis, vage subviolaceis. Long. 8 mill. Brésil. — Paraît différer de toutes les espèces du genre par le prothorax bifoveolé et les élytres moins allongés.

Pseudolagria latipennis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, collo, thorace et femoribus ad basin pro parte rufo-testaceis ; thorace breve et lato, in disco postice impresso, ad basin sinuato et sulcato ; elytris latis, in disco vage brunnescentibus. Long. 7 mill. Brésil. — Diffère du précédent par le prothorax plus large, non bifoveolé et le disque des élytres plus clair que le reste.

Chlorophila ingeniculata n. sp. Elongatus, viridi-metallicus, antennis pedibusque testaceis, elytris opacis testaceo limbatis ; capite ruguloso, subnitido ; thorace parum elongato, subnitido, multiplicato, in disco minute sulcato ; elytris modice elongatis, substriatis ; abdomine pro majore parte aurato. Long. 14 mill. Chine. — Très voisin de *C. carolina* Frm., mais bordure latérale jaune des élytres atteignant la base, genoux non rembrunis, etc.

Chorophila viridissima v. nov. bicoloripes. Pedibus testaceis, femoribus apice metallicis. Japon.

Chorophila viridissima v. nov. obscuripes. Antennis apice pedibusque pro majore parte nigris. Japon.

Statira atripes n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, rufus, antennis ad medium, oculis pedibusque nigris ; thorace elongato ; elytris apice breve mucronatis, lineato punctatis, postice mediocre impressis aut tuberculatis ; pedibus simplicibus, tibiis plus minusve arcuatis. Long. 11 mill. Brésil : Tijuca. — Peut se placer près de *S. armata* Makl., facilement distinct par la coloration entièrement foncée des pattes.

Statira bifoveolata n. sp. Elongatus, nitidus, postice sparse hirsutus, rufescens, elytris iridescentibus, oculis antennisque pro majore parte nigris ; thorace parum elongato, in disco postice bifoveolato, pro parte picecente ; elytris lineato punctatis et late impressis, apice subtuberculatis ; pedibus simplicibus. Long. 10 mill. Brésil. — Voisin de *S. cateñata* Makl. et distinct, à première vue, par son prothorax bifovéolé.

Statira testaceicolor n. sp. Elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus, oculis nigris ; thorace parum elongato ; elytris punctato-striatis ; pedibus simplicibus. Long. 10 mill. Brésil. — Cette espèce, qui se distingue par sa coloration et ses intervalles des élytres presque tous sans points, peut se placer près de *S. gracilis* M.

Statira semiopaca n. sp. Elongatus, pro parte subopacus, pro parte nitidus, sparse hirsutus, nigro-piceus, capite antice, antennis pedibusque pro parte rufescentibus ; capite postice thoraceque densissime punctatis, subopacis ; elytris striato-punctatis, intervallis pro parte et sparse punctatis ; pedibus, simplicibus. Long. 12 mill. Brésil. — A. placer près de *S. flavicornis* M., mais front non impressionné, élytres non obsolètement ponctués vers la suture, etc.

Statira semiatra n. sp. Elongatus, pro parte subopacus, pro parte nitidus, sparse hirsutus, pallido-testaceus, capite postice, thorace abdomineque pro parte nigris ; capite thoraceque dense punctatis, subopacis ; elytris nitidis, striato-punctatis, intervallis pro parte et fortiter sparse punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 9-10 mill. Brésil . Jatahy. — Très distinct du précédent par sa coloration.

Statira Duhanti n. sp. Elongatus, nitidus, albo hirsutus, rufescens, infra corpore pedibusque pro parte piceis, oculis nigris, magnis ; capite lato, inter oculos impresso ; thorace satis breve, fortiter sat sparse punctato ; elytris striato-punctatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *annulicornis* Pic, mais tête impressionnée, yeux très gros, corps hérissé de poils blancs, etc.

Statira alutaceicollis n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, rufo-castaneus, antennis pedibusque pro parte pallidioribus ; capite lato, subalutaceo ; thorace satis breve, alutaceo, medio canaliculato ; elytris striato-punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin des précédents, mais distinct, à première vue, par son prothorax alutacé et sillonné.

Statira bernardana n. sp. Elongatus, nitidus, hirsutus, rufo-testaceus, oculis elytris que nigris ; capite lato ; thorace sat breve, fortiter sat sparse punctato ; elytris elongatis, minute striato-punctatis, intervallis pro parte punctatis et subtuberculatis ; pedibus gracilibus. Long. 6-7 mill. Brésil. A placer près de *S. apicipennis* Pic.

Statira bilineaticollis n. sp. Elongatus, parum nitidus, apice hirsutus, testaceus, tarsis anticis oculisque nigris, thorace lateraliter nigro lineato, elytris nigro-metallicis, rufo-testaceo cinctis, his punctato-striatis. Long. 8 mill. Brésil : Bahia. — Voisin de *S. elegans* M., très distinct par son prothorax orné, de chaque côté, d'une bande noire.

Statira subcatenata n. sp. Parum elongatus, nitidus, fere glaber, nigro-piceus, antennis, pro parte rufescenti-

bus, thorace postice rufo marginato, elytris viridi-metallicis ; thorace brevis, minute punctato ; elytris satis latis, minute striato punctatis, postice pro parte subcatenatis ; pedibus simplicibus. Long. 9 mill. Brésil. — A. placer près de *S. amæna* M.

Statira discoidalis n. sp. Parum elongatus, nitidus, fere glaber, nigro-piceus, antennis, thorace postice tarsisque rufescentibus, elytris viridi-metallicis, antice late rufo notatis. Long. 9 mill. Brésil. — Très voisin du précédent, élytres un peu moins allongés et de coloration différente.

Statira pilicornis n. sp. ♂. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, rufo-testaceus ; antennis longe hispidis ; thorace elongato ; elytris postice et diverse nodulosis ; tibiis anticis valido dilatatis, femoribus posticis deplanatis, postice angulatis, tibiis curvatis, deformibus et ciliatis. Long. 15 mill. Brésil. — Espèce voisine de *S. meleagris* M., bien distincte par la structure des ses pattes et par ses élytres non maculés.

Statira caracaensis n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hirsutus, rufus, elytris subiridescentibus ; oculis nigris ; thorace parum elongato ; elytris minute punctato striatis, postice sparse mediocre impressis ; femoribus posticis ♂ deplanatis et subangulatis, tibiis sinuatis et difformibus, pro parte excavatis. Long. 11-12 mill. Brésil : Caraça. Diffère du précédent, en plus de la sculpture élytrale, par les tibias antérieurs simples ♂ et les postérieurs différents.

Pseudoblapida n. gen. (1). Espistoma fere indistincta ; elytris angustatis, apice mucronatis, regulariter striatis. — Genre intermédiaire entre *Blapida* Perty et *Camaria* Serv., se rapproche davantage du premier par les élytres munis au sommet d'un long mucron sillonné et s'en dis-

(1) Etabli pour l'ancien *Blapida boliviensis* Pic et les formes voisines.

tingue, à première vue, par la forme plus étroite des élytres et ces organes non marqués d'impressions irrégulières.

Falsocamaria n. gen. Articulis ultimis antennarum elongatis aut non dilatatis ; thorace lateraliter minute marginato ; elytris elongatis, apice inermibus ; mesosterno antice subarcuato, læve, intuberculato. Ce genre, très voisin de *Camaria* Serv., s'en distingue, à première vue, par la structure des antennes dont les articles ne sont pas élargis mais assez longs ou très allongés ; la forme du mesosternum est également différente.

Falsocamaria obscura n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, vage subænescens, pedibus pro parte cupreis ; capite thoraceque irregulariter, pro parte dense et ruguloso punctatis, illo breve, antice attenuato, lateraliter sinuato, in disco biimpresso ; elytris satis elongatis, apice attenuatis, minute striato-punctatis. Long. 28 mill. Chine : Fouchou.

Campsiomorpha n. gen. (1). Articulis ultimis antennarum elongatis ; thorace lateraliter minute marginato ; elytris latis, apice inermibus ; mesosterno villosa, antice arcuato et fere deplanato. Diffère de *Camaria* Serv. par la structure du mesosternum, les antennes allongées et, à première vue, de *Campsia* Serv. par les élytres inermes au sommet.

Calydoniomorpha n. gen. Capite breve ; antennis brevissimis, apice dilatatis ; thorace antice in medio immarginato ; elytris apice inermibus ; pedibus brevibus. — Ce nouveau genre se distinguera, à première vue, de *Camaria* Serv., dont il est voisin, par les antennes très courtes, dépassant peu le bord antérieur du prothorax, la tête relativement courte ; diffère, en outre, de *Calydonis*

(1) Etabli par les anciens *Camaria lata* Pic, *ducalis* Frm., et voisins.

Pascoe (ex description) par le clypeus distinct, le prothorax étroitement marginé latéralement,

Calydoniomorpha brevicornis n. sp. Elongatus, convexus, nitidus, nigro-viridescens, pro parte æneus, pedibus pro parte rufescentibus ; antennis brevibus, apice valde dilatatis ; thorace breve, antice parum attenuato, minute et sparse punctato ; elytris striato-punctatis, ad basin subimpressis ; pedibus simplicibus. Long. 25 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par ses antennes très courtes, dépassant un peu la partie antérieure du prothorax.

Camaria acutipennis (Fairm.). Modice elongatus, postice acuminatus, nitidissimus, æneus ; capite thoraceque minute et sparse punctatis, illo transverso, lateraliter subinnuato ; elytris sat latis, apice acuminatis, minutissime lineato punctatis. Long. 33-34 mill. ? Indes. — Très voisin de *C. spinipennis* Cast., de coloration plus foncée, élytres à stries indistinctes et finement ponctués en rangées.

Camaria spinipes n. sp. ♂ Elongatus, nitidus, æneus, tibiis tarsisque rufescentibus ; thorace transverso, fortiter et irregulariter punctato ; elytris elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis ; tibiis curvatis, posticis ad basin longe spinosis. Long. 28 mill. Brésil. — Voisin de *C. javana* Pic, plus convexe, élytres plus fortement ponctués, etc. ; d'ailleurs distinct entre tous par ses tibias postérieurs munis d'une longue épine à sommet émoussé.

Camaria fasciculata n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, nitidissimus, æneo-viridescens aut æneus ; thorace transverso, minute punctato ; elytris minutissime lineato-punctatis, apice attenuatis ; tibiis arcuatis, posticis ad basin fasciculatis. Long. 13 mill. Brésil. — Moins allongé, moins fortement ponctué que les précédents avec les tibias postérieurs non épineux mais munis d'un fascicule de poils jaunes.

Camaria lævipennis n. sp. Elongatus, nitidissimus, fere impunctatus, æneus, elytris minute lineato punctatis ; ti-

biis arcuatis, simplicibus. Long. 25 mill. Bolivie. — Espèce très distincte par ses élytres, sans ponctuation appréciable à l'œil.

Camaria superba n. sp. Oblongus, nitidissimus, fere impunctatus, viridescens, elytris late purpureo vittatis, ad basin gibbosis et impressis, pedibus simplicibus. Long. 22 mill. Colombie. — Très distinct du précédent par la forme plus courte, les élytres impressionnés à la base et ornés de bandes longitudinales pourées.

Camaria subrufescens n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, æneo-viridescens aut fusco-æneus, pedibus pro majore parte elytrisque postice et lateraliter rufescentibus ; thorace transverso, lateraliter ad medium subangulato, minute et sparse punctato ; elytris striato-punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 28 mill. Brésil. — Voisin de *C. spinipes* Pic, prothorax plus finement ponctué et subanguleux latéralement, élytres à stries plus étroites, etc.

Camaria subopacipennis n. sp. Elongatus, parum nitidus, elytris ad apicem fere opacis, æneus ; thorace parum transverso, lateraliter sinuato, sat fortiter et irregulariter punctato ; elytris fortiter striatis et pro parte fortiter punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 24-25 mill. Brésil. — Moins large et plus fortement strié que le précédent.

Camaria brasiliensis n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-æneus, elytris apice, abdomine tibiisque pro parte rufescentibus ; thorace transverso, lateraliter subarcuato, ad basin transverse sulcato, satis et sparse punctato ; elytris striato-punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 25 mill. Brésil. — Un peu plus convexe que le précédent avec le prothorax différent, sillonné à la base, etc.

Camaria sinuaticollis n. sp. Elongatus, nitidus, æneus, elytris viridi striatis, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus ; thorace brève, antice et lateraliter

sinuato, postice transverse sulcato, sat fortiter et sparse punctato ; elytris punctato-striatis ; pedibus simplicibus. Long. 23 mill. Brésil. — Voisin des précédents par sa forme, très distinct par la structure de son prothorax très court, fortement sinué en avant et sillonné sur la base.

Camaria impressipennis n. sp. Oblongus, nitidus, æneus ; thorace breve, lateraliter sinuato, angulis posticis prominulis ; elytris minute lineato-punctatis, ad basin impressis et post scutello excavatis ; pedibus simplicibus. Long. 21 mill. Brésil. — Espèce très distincte par la forte impression de la base des élytres, derrière l'écusson.

Camaria paranana n. sp. Oblongus, nitidus, viridi-subæneus, minute punctatus, elytris ad basin impressis. Long. 18 mill. Parana. — Plus court, plus verdâtre que le précédent avec les élytres faiblement impressionnés derrière l'écusson et les angles postérieurs du prothorax droits.

Camaria paranana v. nov. minuta. Oblongus, nitidissimus, minute punctatus, æneus, infra corpore pedibusque pro parte viridescentibus, tibiis pro parte rufescentibus, elytris lineato-punctatis. Long. 14 mill. Brésil. — Moins robuste que *paranana* type, avec les élytres moins acuminés au sommet.

Camaria semirufescens n. sp. ♂ Elongatus, convexus, nitidus, rufescens, elytris piceo-æneis, apice rufescentibus ; thorace transverso, minute et sparse punctato, rufescente ut in capite ; elytris minute lineato-punctatis ; tibiis arcuatis, posticis ad basin longe fasciculatis. Long. 20 mill. Brésil. — Très voisin de *C. fasciculata* Pic par la structure de ses pattes, mais de forme moins large, avant-corps roussâtre, tête faiblement impressionnée transversalement vers les yeux.

Camaria purpureomaculata n. sp. Elongatus, postice acuminatus, nitidus, viridi-cupreus, minute punctatus ; elytris viridescentibus, purpureo maculatis et lineatis, his

substriatis et minute lineato punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 20 mill. Bolivie. — A placer près de *C. speciosa* Pall., plus allongé et d'ailleurs très distinct par la couleur pourprée, en partie disposée transversalement sur les intervalles verts des élytres.

Xanthotopia semitestacea n. sp. Parum elongatus, nitidus, nigro-cœruleus, capite thoraceque supra antennisque nigris, elytris testaceis. Long. 17 mill. Congo. — Ressemble à *X. congoana* Pic, mais prothorax foncé et membres moins robustes.

Xanthotopia gabonica n. sp. Satis elongatus, nitidus, viridescens, thorace supra nigrescente, antennis ad basin, palpis, labro abdomineque apice rufis. Long. 17 mill. Gabon. — Forme de *X. congoana* Pic, mais de coloration très différente ; plus grand que *X. cœruleata* Frm. avec le prothorax noirâtre, etc.

Lyprops diversiceps n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus, densissime punctatus et luteo pubescens, brunnescens, capite postice nigro et glabro. Antennis satis brevibus, apice dilatatis ; thorace transverso, lateraliter subarcuato ; elytris parum elongatis, apice attenuatis. Long. 8 mill. Gabon. — Espèce très distincte de *Buffeventi* Pic par son revêtement pileux, qui laisse une partie glabre sur la tête, joint au prothorax transversal.

Lyprops assinicus n. sp. Oblongus, breve et sparse pubescens, nitidus, niger, elytris vage subæneis. Capite dense punctato ; antennis brevibus, parum robustis ; thorace breve, lateraliter arcuato, fortiter sat dense punctato ; elytris latis, apice attenuatis, fortiter et dense punctatis. Long. 14 mill. Assinie (Alluaud). — Par sa taille voisin de *L. rugatulus* Frm., très distinct par les élytres dépourvus de lignes longitudinales et l'aspect plus brillant.

Lyprops Alluaudi n. sp. Oblongus, breve et sparse pubescens, nitidus, nigro-subæneus, elytris cupreis. Capite thoraceque fortiter sat sparse punctatis ; elytris latis, for-

titer et dense punctatis et pro parte plicatis. Long. 12 mill. Assinie (Alluaud). — Diffère du précédent par la coloration, la ponctuation plus espacée de la tête, le prothorax plus court et peu arqué sur les côtés.

Lyprops cupripennis n. sp. Oblongus, breve et sparse pubescens (scutello glabro), nitidus, nigro-subæneus, elytris cupreis. Long. 12 mill. Côte d'Ivoire. — Très voisin du précédent, mais écusson non pubescent, prothorax plus rétréci postérieurement et ponctuation de la tête très irrégulière.

Lyprops sicutensis n. sp. Oblongus, sat breve pubescens, nitidus, nigro-subæneus, elytris cupreis, post scutello impressis. Capite postice mediocre punctato ; thorace lateraliter parum arcuato, in disco minute et sparse punctato. Long. 11 mill. Fort Sibut. — Forme et coloration des deux précédents, en diffère par la ponctuation moins forte et plus écartée sur le disque du prothorax et par les élytres ayant antérieurement une impression oblique discale.

Lyprops Auberti n. sp. Oblongus, breve et sparse pubescens, nitidus, niger, elytris piceis, subæneis. Thorace diverse punctato ; elytris parum latis. Long. 10-11 mill. Gabon (ex coll. Aubert). — Forme moins trapue que les précédents avec les élytres un peu plus longs et à coloration différente.

Lyprops armitagei n. sp. Oblongus, breve et sparse pubescens, parum nitidus, rufus, thorace in disco brunnescente, antennis pedibusque pro parte piceis. Long. 10 mill. Sénégal. — Cette espèce se distingue, à première vue, par sa coloration en majeure partie rousse.

TABLE

POUR LE VINGT-SIXIÈME FASCICULE

	Pages.
Introduction	1
Descriptions abrégées diverses	2

